



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
इंदिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय
रायपुर



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 12-01-2021

नारायणपुर(छत्तीसगढ़) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2021-01-12 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2021-01-13	2021-01-14	2021-01-15	2021-01-16	2021-01-17
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	30.0	31.0	31.0	31.0	30.0
न्यूनतम तापमान(से.)	14.0	13.0	13.0	13.0	12.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	85	80	80	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	35	35	30	30	30
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
पवन दिशा (डिग्री)	90	90	79	109	79
क्लाउड कवर (ओक्टा)	3	1	0	0	0

मौसम सारांश / चेतावनी:

भारत मौसम विभाग (IMD) से प्राप्त पूर्वानुमान के अनुसार, अगले पांच दिनों के दौरान नारायणपुर जिले में मौसम शुष्क रहेगा एवं आसमान साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30.0 से 31.0 °C के आस-पास एवं न्यूनतम 12.0 से 14.0 °C रहने की संभावना है। इस दौरान हवा में सुबह लगभग 80 से 85 % और शाम के समय 30 से 35 % नमी रहने की संभावना है। मुख्यतः पूर्व दिशा से लगभग 2 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की संभावना है।

सामान्य सलाहकार:

सब्जियों की नर्सरी में आर्द्र गलन (डंपिंग ऑफ़) की समस्या दिखाई देने पर कॉपर-ओक्सी क्लोराइड की ३ मि.ली. मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर मिट्टी में ड्रैचिंग करें।

लघु संदेश सलाहकार:

गेहूँ की फसल में 20 दिन के अंतराल में सिंचाई करें एवं खेत में जलभराव न होने दें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	Where the wheat crop has become 21 day old, then first irrigation should be done.

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	आम में जहाँ पर बौर आना प्रारंभ हो गया है वहाँ 50 प्रतिशत बौर आने पर 15 दिन के अंतराल में सिंचाई करें, लगातार पानी देने से बौर पत्तियों में परिवर्तित हो जाते हैं।

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	आलू की फसल में 12-15 दिन के अंतराल में सिंचाई करें.

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	दुधारू पशुओं को खली/गुड के साथ सांद्रित आहार इससे ठण्ड में पशुओं के शरीर को गर्म रखने में मदद मिलती है.

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
पौध - संरक्षण	आलू में अगेती झुलसा के लक्षण दिखाई देने पर मेटालेक्जिल (8%)+मेंकोजेब (6.4%) की 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से 10 से 15 दिन के अंतराल 2 से 3 छिडकाव करें.
पौध - संरक्षण	सेमी में मैनी कीट दिखने पर थाईमैथोक्जेम 25 डब्लू जी पाउडर का 1 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी की दर से शाम के समय छिडकाव करें.
पौध - संरक्षण	कद्दू वर्गीय सब्जियों में मृदु रोमिल आसिता (डाउनी मिल्ड्यू) से बचाव के लिए मेटालेक्जिल 8%+मेंकोजेब 64% की 20 ग्राम मात्रा प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर छिडकें
पौध - संरक्षण	चने की फसल में एकीकृत कीट प्रबंधन के लिए फिरोमोन प्रपंच (Pheromone trap) प्रकाश प्रपंच (Light Trap) या खेतों में पक्षियों के बैठने हेतु टी (T) आकार की खूंटी (Bird Perch) स्थापित करें.
सामान्य सलाह	फलदार वृक्षों के तने के चारों ओर थाला बनाएं और अनुसंशित मात्र में उर्वरकों का प्रयोग कर अच्छी तरह से सिंचाई करें